

核准日期:2003年03月25日 修改日期:2019年05月30日
修改日期:2008年07月23日 修改日期:2019年12月01日
修改日期:2016年10月08日 修改日期:2022年10月10日



史达功® 右美沙芬愈创甘油醚糖浆说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称:右美沙芬愈创甘油醚糖浆

英文名称:Dextromethorphan Hydrobromide and Guaifenesin Syrup

汉语拼音:Youmeishafen Yuchuanganyoumi Tangjiang

【成份】本品为复方制剂,每毫升含氢溴酸右美沙芬1.5毫克,愈创甘油醚10毫克。

辅料为:蔗糖、枸橼酸、苯甲酸钠、羟苯甲酯、黑加仑香精、胭脂红、乙醇、纯水。

【性状】本品为着色的澄清液体;具芳香气味。

【作用类别】本品为镇咳祛痰类非处方药药品。

【适应症】用于上呼吸道感染(如普通感冒和流行性感冒)、支气管炎等引起的咳嗽、咳痰。

【规格】1ml:含氢溴酸右美沙芬1.5mg,愈创甘油醚10mg。

【用法用量】口服。12岁以上儿童及成人一次10~20毫升,一日3次,24小时内不超过4次。

12岁以下儿童用量见下表:

年龄(岁)	体重(公斤)	一次用量(毫升)	次数
1-3	10-15	5	一日3次 24小时 内不超 过4次
4-6	16-21	5	
7-9	22-27	10	
10-12	28-32	10	

【不良反应】可见头晕、头痛、嗜睡、易激动、暖气、食欲缺乏、便秘、恶心、皮肤过敏等,停药后上述反应可自行消失。

【禁忌】1.对氢溴酸右美沙芬或愈创木酚甘油醚过敏者禁用。

2.妊娠3个月内妇女禁用。

【注意事项】1.用药7天,症状未缓解,请咨询医师或药师。

2.1岁以下儿童应在医师指导下使用。

3.抑郁症、消化道溃疡、痰量过多、哮喘等患者以及老年人应在医师指导下使用。

4.孕妇及哺乳期妇女慎用。

5.服药期间不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

6.如服用过量或出现严重不良反应,应立即就医。

7.对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。

8.本品性状发生改变时禁止使用。

9.请将本品放在儿童不能接触的地方。

10.儿童必须在成人监护下使用。

11.如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1.本品与抗抑郁药、单胺氧化酶抑制剂同服会产生不良反应,应避免合用。

2.本品不宜与乙醇及其他中枢神经系统抑制药物并用,因可增强对中枢的抑制作用。

3.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

【药理作用】氢溴酸右美沙芬为中枢性镇咳药,可抑制延脑咳嗽中枢而产生镇咳作用,其镇咳作用与可待因相等或稍强,长期服用无依赖性 and 耐受性;愈创木酚甘油醚为祛痰剂,能使呼吸道腺体分泌增加,使痰液稀释,易于咳出。

【贮藏】遮光,密封,在阴凉处保存。

【包装】塑料瓶装:60ml/瓶;120ml/瓶;150ml/瓶;180ml/瓶

【有效期】暂定24个月

【执行标准】WS₁-(X-069)-2004Z-2016

【批准文号】国药准字H11021837

【药品上市许可持有人】

企业名称:史达德药业(北京)有限公司

注册地址:北京市密云区经济开发区云腾路15号

邮政编码:101500

联系方式:010-69076655

用药咨询电话:010-69076655转129

网 址:www.stadabeijing.com

【生产企业】企业名称:史达德药业(北京)有限公司

生产地址:北京市密云区经济开发区云腾路15号

如有问题可与药品上市许可持有人联系

