

核准日期:2003年04月18日 修改日期:2019年12月01日
修改日期:2008年08月05日 修改日期:2022年08月07日
修改日期:2016年10月08日

OTC
乙类

格力特®

愈创甘油醚糖浆说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称:愈创甘油醚糖浆

英文名称:Guaifenesin Syrup

汉语拼音:Yuchuanguanganyoumi Tangjiang

【成份】本品每ml含愈创甘油醚20mg。

辅料为:蔗糖、枸橼酸、胭脂红、焦糖、薄荷脑、苯甲酸钠、羟苯甲酯、草莓香精、山梨醇、乙醇、纯水。

【性状】本品为着色的澄清粘稠液体;带有矫味剂的芳香气味。

【作用类别】本品为祛痰类非处方药药品。

【适应症】用于呼吸道感染引起的咳嗽、多痰。

【规格】2%

【用法用量】口服。12岁以上儿童成人一次5~10毫升,一日3次。饭后服用。

12岁以下儿童用量见下表:

年龄(岁)	体重(公斤)	一次用量(毫升)	次数
1-3	10-15	2-3	一日3次
4-6	16-21	3.5-4.5	
7-9	22-27	5-6	
10-12	28-32	6.5-7.5	

【不良反应】可见恶心、胃肠不适、头晕、嗜睡和过敏等。

【禁忌】1.肺出血、肾炎和急性胃肠炎患者禁用。

2.妊娠3个月内妇女禁用。

【注意事项】1.用药7天,症状未缓解,请咨询医师或药师。

2.1岁以下儿童应在医师指导下使用。

3.消化道溃疡患者慎用。

4.孕妇及哺乳期妇女慎用。

5.对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。

6.本品性状发生改变时禁止使用。

7.请将本品放在儿童不能接触的地方。

8.儿童必须在成人监护下使用。

9.如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

【药理作用】愈创甘油醚为刺激性祛痰药,能刺激胃黏膜,反射地引起呼吸道腺体分泌增加,使痰液稀释,易于咳出,从而产生祛痰作用。

【贮藏】遮光,密封保存。

【包装】塑料瓶装:60ml/瓶;120ml/瓶

【有效期】暂定24个月

【执行标准】WS-10001-(HD-1248)-2002-2022

【批准文号】国药准字H11022321

【药品上市许可持有人】

企业名称:史达德药业(北京)有限公司

注册地址:北京市密云区经济开发区云腾路15号

邮政编码:101500

联系方式:010-69076655

用药咨询电话:010-69076655转129

网址:www.stadabeijing.com

【生产企业】企业名称:史达德药业(北京)有限公司

生产地址:北京市密云区经济开发区云腾路15号

如有问题可与药品上市许可持有人联系

STADA